



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius ignipes Moser

Sous conifères, notamment sous épicéas en terrain argileux. Chapeau 15-40 mm, sec, vert olivâtre puis brun roussâtre, s'assombrissant surtout par le centre. Lames cannelle olivacé, puis rouillées. Stipe jaune-vert plus ou moins guirlandé d'un voile rouge, avec la base orangé saumoné vif et le mycélium de la même couleur. Chair jaune à brunâtre, orangée à la base. Odeur et saveur sans particularité. KOH brun-rouge sur cuticule et chair. Spores 6,5-8 x 4,5-5,5 µm.

A comparer avec :

- *C. squamulosus* : sous épicéas sur sol calcaire, mycélium blanc ;
- *C. olivaceofuscus* : lié aux feuillus, notamment sous charmes, parfois sous chênes ou hêtres.

Il ne fait aucun doute que ces cortinaires sont un peu avancés (vu également la période de récolte), mais qu'ils appartiennent à la Sous-section *Leprocycbe* Série *venetus*. Il semble possible de conclure pour le binôme ici décrit, d'une part au vu de l'écologie, mais d'autre part et surtout en raison du mycélium orange que nous avons observé, s'agissant de la seule espèce de la série à posséder ce caractère. Ce cortinaire serait très rare et donc peu signalé ou présenté dans la littérature, nous l'avons récolté en janvier 2018, sous épicéas (seule essence présente) dans le secteur de Brigueuil.

Biblio : ADC Bidaud et al. - JEC n° 9, 2007.