



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius rhizophorus Bidaud & Consiglio

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau 4-8 cm, très visqueux, glabre, non hygrophane, totalement jaune puis évoluant en orangé par le centre. Lames crème ochracé puis rouillées. Stipe blanc, jaunissant sur le bulbe, qui est turbiné à marginé prolongé par des rhizomorphes blancs. Chair blanche, jaune dans la moelle du stipe et dans le bulbe. Odeur un peu fruitée à herbacée, saveur douce. KOH brun acajou sur la cuticule et nul sur la chair. Spores 8,5-12,5 x 5,5-6,5 μm , nettement verruqueuses et amygdaliformes.

Ce cortinaire de la Section *Multiiformes* Série *Talus* a été récemment décrit (2012), il est à comparer avec :

- *C. elevatior* : chapeau givré de blanc (rappelant celui de *C. caperatus*), spores plus petites, ellipsoïdes finement piquetées ;
- *C. gracilior* : chapeau 2-5 cm, jaune pâle à jaune ochracé, hygrophane, couvert d'une viscosité légèrement amère, et d'un petit bulbe plus ou moins marginé.

Notre récolte a été réalisée en novembre 2012 sous majorité de chênes verts dans les bois de Leuzois à Soulignonne, typiquement sur sol calcaire, les spores contrôlées mesuraient 10-12 x 5,5-6,5 μm .

Biblio : ADC Bidaud et al. - Il Genere Cortinarius in Italia 6 : F161 (2012).