

St Amant de Nouère (16), oct. 2012



Soulignonne, oct. 2012



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius hillieri Henry

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau couvert de voile blanc grisâtre (donnant un aspect laineux) sur fond ocre fauve. Lames crème puis brun rouillé. Stipe concolore au chapeau, base dilatée bulbeuse. Chair blanchâtre crème marbrée de veines brunes. Odeur fruitée, de mirabelle ou de frangipane, saveur douce. Spores 8,5-10 x 6,5-7 μm . A comparer avec :

- *C. diffractosuavis* : surtout sous chênes verts, chair blanchâtre non marbrée, odeur de mirabelle ou d'alcool de poire à la coupe (rappelant *I. bongardii*), spores plus grandes, 10-12,5 x 7-8 μm ;
- *C. alsomatii* : stipe non bulbeux, inodore ;
- *C. sordescens* et *C. subferrugineus* : chapeau brun terne.

Espèce de la Section *Sericeocybe*, probablement peu fréquente, mais également assez méconnue. A ce jour, nous avons quelques récoltes qui semblent se rapporter à ce taxon, notamment en forêt de chênes verts dans les bois de Leuzois à Soulignonne.

Biblio : ADC Bidaud et al.