



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagnesi

Synonymes probables : *C. rubellus*, *C. orellanoides*

Nom français : Cortinaire très joli

Sous conifères sur sol plutôt non calcaire, parfois sous feuillus. Chapeau souvent conique, feutré, brun-roux à brun orangé. Lames orangé à brun rouille. Stipe ochracé roussâtre plus ou moins couvert de voile jaune formant des bandelettes ou des mouchetures. Chair crème jaunâtre, roussâtre vers la base. Odeur raphanoïde, saveur douce. Spores 8-11 x 6,5-8,5 µm, typiquement subglobuleuses.

A noter l'existence de *C. henrici*, taxon dont les différences paraissent bien ténues. A comparer surtout avec deux espèces à spores également globuleuses :

- *C. limonius* : plutôt sous épicéas en montagne, chapeau hygrophane jaunissant en séchant ;
- *C. tofaceus* (parfois écrit *tophaceus*) : plutôt sous hêtres, chapeau fortement méchuleux et odeur typique de pomme de terre crue.

C. orellanus est également ressemblant, il pousse majoritairement sous feuillus et ses spores sont amygdaliformes.

Dans la région, ce cortinaire apparaît dans les bois avec majorité de châtaigniers, surtout durant les mois chauds, entre juin et septembre, nos récoltes automnales étant bien plus rares.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.



St Hilaire de Villefranche, juil. 2014

