



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Hydnellum concretum (Pers. ex Schw.) Banker

Généralement en forêts de feuillus, plus rarement de conifères. Chapeau plus ou moins zoné, marge restant longtemps blanche. Hyménium garni d'aiguillons rose brun à rougeâtre brun. Odeur faiblement farineuse. Spores 4,5-6 x 3,5-4,5 µm, brunes, ornées de bosses à sommet tronqué. A comparer surtout avec *H. scrobiculatum*, venant surtout sous conifères, qui présente des spores de taille légèrement supérieure, 5,5-6,5 x 4,5-5,5 µm, et dont le sommet des verrues est arrondi.

Il est à noter que toutes les récoltes que nous présentons sur cette fiche n'ont pas été contrôlées au microscope, nous nous efforcerons à l'avenir de procéder à cet examen afin d'apporter des compléments d'informations, car seul l'examen des spores semble pouvoir différencier avec certitude *H. concretum* et *H. scrobiculatum*. Nous pouvons néanmoins préciser que ces *Hydnellum* peuvent se rencontrer tous les ans, entre les mois d'août et de novembre, en forêts de feuillus à l'intérieur des terres et en forêts mixtes sur le littoral. Également, nous avons constaté la présence de gouttelettes d'exsudation sur des spécimens en pleine croissance, caractère non signalé dans la littérature à notre disposition.

Biblio : BK2 261

Fiche réalisée en juillet 2015 par Patrice TANCHAUD





