



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Tricholoma ustaloides*** Romagnesi

Noms français : Tricholome à pied blanc et brun, Tricholome faux-brûlé

Sous feuillus. Chapeau brun-fauve à brun orangé, visqueux, mucus très amer. Lames blanches puis tachées de roux. Stipe blanc au sommet, roussâtre sous une ligne annulaire sans relief. Odeur farineuse et saveur très amère. Spores 5,5-7 x 4,5-5,5 µm.

A comparer avec d'autres tricholomes à chapeau brun-roux poussant sous feuillus, citons pour notre région :

- *T. ustale* (sous hêtre) et *T. quercetorum* (sous chêne) : mucus non amer, aucune zone annulaire sur le stipe ;
- *T. populinum* : sous peupliers et saules, chapeau plus clair, doux ;
- *T. fulvum* : sous bouleaux et peupliers, chapeau cannelé au bord, chair jaune ;
- voir également la fiche de *T. batschii* pour les espèces poussant sous conifères.

Dans notre secteur, ce tricholome est visible chaque automne. A noter l'existence de *T. ustaloides* var. *aurantioides* qui pourrait distinguer des récoltes à chapeau orangé, mais que nous assimilons au type.

Biblio : littérature courante.

*Fiche réalisée en juin 2024 par Patrice TANCHAUD*

