



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius anomalus* (Fr. : Fr.) Fr.

Synonyme : *C. azureus*

Nom français : Cortinaire anormal

En forêt de feuillus. Chapeau sec, micacé, ochracé grisâtre à gris-brun clair, parfois bleuté violacé au bord, avec un voile blanc jaunâtre peu abondant. Lames bleu lilacin puis brun-gris. Stipe bleuté lilacin à blanchâtre ochracé, voile blanc peu visible. Chair blanche, parfois lilacine dans le chapeau et au sommet du stipe. Odeur légèrement désagréable, saveur douce. Spores 7,5-10 x 6-8,5 µm. A comparer avec :

- *C. albocyaneus* (au sens de la Flora photographica et de Funga nordica, interprété différemment dans l'ADC où il s'agit d'un taxon à spores elliptiques proche de *C. alboviolaceus*) : surtout sous bouleaux et hêtres, chapeau légèrement visqueux, blanc à gris bleuté pâle ;
- *C. lebretonii* (cf. cette fiche avec de nombreuses espèces succinctement comparées page 3) : très fréquent, stipe typiquement guirlandé d'un voile jaune ochracé.

Ce cortinaire peut se rencontrer occasionnellement sur le littoral et à l'intérieur des terres, généralement durant les mois d'automne.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.





