



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

## *Sarcodon joeides* (Pass.) Pat.

Synonyme : *Hydnellum ioeides*

En forêt de feuillus. Chapeau feutré, un peu fibrilleux à subsquamuleux, ocre brun à brun-rose, un peu rougeâtre en vieillissant. Aiguillons brun rosâtre. Stipe subconcolore au chapeau, vert sombre à la base. Chair rose lilas, lie-de-vin à violette à la coupe. Odeur farineuse, saveur un peu amère et âcre. Sporée brune. Spores 5,5-6,5 x 4,5-5 µm. Boucles absentes.

A comparer avec *S. fulgineoviolaceus* : tons nettement bleu-violet particulièrement dans la chair, base du stipe rougeâtre.

A noter une ressemblance plus ou moins proche avec quelques espèces du genre *Bankera* (qui se distingue par sa sporée blanche), par exemple *B. cinerea*.

Par le passé, cette espèce semble avoir été déjà notée dans la région, notamment sur le littoral. Nous devons les récoltes présentées à :

- Robert Lagarde, en septembre 2011 sur la commune de Bouteville ;
- David Fabbri, en juillet 2021 dans les bois de Louzac St André.

Biblio : BK2 276 - Walter Jülich Guida alla determinazione dei funghi, Vol. 2°.