



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius vesterholtii Froslev & T.S. Jeppesen

Synonyme : *C. provençalis*

Nom français : Cortinaire de Vesterholt

Description : chapeau de 4 à 8 (10) cm de diamètre, d'abord convexe à convexe-plan à marge enroulée. Cuticule visqueuse puis sèche remarquablement fibrilleuse, présentant un voile blanc en son centre ; couleur ocre fauve à tonalité lilacine surtout au disque ; réaction rose-ambéré à la potasse ; stipe relativement court à bulbe marginé, remarquablement teinté d'un beau violet éclatant devenant purpurin dans la vétusté ; lames serrées, mauve vif puis rouillées ; chair blanchâtre mais violette au cortex du stipe à réaction subnulle à la potasse (rose sale) ; spores 9-11,5 x 6-7 µm.

Récoltes : en 2011 sous chênes verts en milieu sablonneux sur l'île d'Oléron ; et en 2009 sous chênes verts mêlés de chênes pubescents en terrain calcaire à Soullignottes (17).

Remarques : ce cortinaire est remarquable par la couleur ocracée du chapeau contrastant avec le joli mauve du stipe et des lamelles ; plusieurs espèces telles que *C. subamethystinus* et *C. violaceipes* semblent proches de ce taxon.

Biblio : Mycological. Research 110 (2006) 1046-1055-1058

Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET

