




François Valade - Marennes (17), novembre 2015



cheilocystides 25-32x12-17 μm
spores 7,1-8,3-8,5-9,1 μm

Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

Mycena corynephora Maas Geesteranus

Synonyme : *Mycena quercus-ilicis*, ss Robich (1989)

Nom français : Mycène floconneuse

Sur écorces de feuillus parmi les mousses. Chapeau 1-5 mm, blanc blanchâtre, prumineux-floconneux. Lames blanches. Stipe concolore, entièrement floconneux. Spores 7-9 x 6-8 μm , largement elliptiques. Cheilocystides typiquement vésiculeuses et verruqueuses. Dans notre région et avec une écologie similaire, à comparer surtout avec *M. adscendens*, espèce plus fréquente, dont le stipe est moins prumineux ; en cas de doute ses spores sont moins globuleuses et surtout ses cheilocystides sont prolongées d'un col flexueux caractéristique.

Petites mycènes corticoles de la section *Sacchariferae* (taille 1 à 2 mm) récoltées sur tronc moussu de feuillus au sol, dans le bois de la Gataudière à Marennes (17), en novembre 2015.

Biblio : B&K3 325 ; GEPR p. 402 ; Robich, *Mycena d'Europa* (2003). p. 636.