



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius rioussetorum*** Bidaud, Moëgne-Loccoz & Reumaux

Nom français : Cortinaire des Riousset

Description : chapeau de 4 à 8 cm de diamètre, d'abord convexe à convexe-plan à marge enroulée. Cuticule visqueuse puis sèche, d'abord teintée d'une couleur rose-mauve délicat et évanescant sur fond crème pâle (mastic ?), rapidement envahie de fibrilles rousses pour finir entièrement jaune-ocracé ; voile blanc présent sous la forme de plaques floconneuses blanches au disque ; réaction roussâtre ambré à la potasse ; stipe relativement court à bulbe marginé voire pseudovolvacé, teinté de lilacin surtout au sommet rapidement ocracé dans la vétusté ; lames serrées, bleu lilacin puis rapidement rouillées ; chair crème-blanchâtre, mauve à gris lilacin au cortex du stipe, à réaction jaune ambré à la potasse ainsi que sur le rebord du bulbe ; spores 9-11,5 x 5.5-6 µm.

Récoltes : en 2009 et 2011 sous chênes verts en milieu sablonneux sur l'île d'Oléron (17).

Remarques : ce cortinaire, délicatement teinté de mauve lilacin chez les exemplaires jeunes et frais, devient méconnaissable par sa décoloration très rapide en jaune-ocracé.

Biblio : Bull. F.M.D.S 2000. 18 : 21-26

*Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET*

