



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius bulbolatens Chevassut & Henry

Chapeau de 5 à 10(12) cm de diamètre, convexe à centre aplani et à marge fortement enroulée ; revêtement rapidement sec, mat, fibrilleux, de teintes variant de blanchâtre à crème-ivoirin puis ocracé à jaune pâle ; cuticule rose-orangé à la potasse ; lamelles pâles, d'abord blanchâtres à reflet grisâtre ou bleutées puis incarnat enfin argillacées ; arête serrulée ; stipe remarquablement bulbeux-turbiné dans la jeunesse (mais non marginé) puis clavé à base radicante, blanc au sommet et ocracé sur le bulbe ; cortine blanche ; chair ferme, crème- blanchâtre à odeur un peu terreuse ; réaction jaune ambré à la potasse ; spores remarquablement subglobuleuses à ovoïdes : 9-11 x 8-9 μm .

Sujets récoltés à Trizay (17) sous chênes verts en novembre 2010 et 2011 en formation quasi hypogée et fasciculée.

Remarques : ce cortinaire très rare a été décrit du midi méditerranéen en 1986 ; l'épithète qui le qualifie signifie "à bulbe caché" ; en effet, le bulbe remarquablement évasé dans la jeunesse tend à s'amincir pour devenir clavé lorsque le stipe s'allonge pour ne laisser qu'un léger renflement ; en outre, avec *C. caesiocortinatus*, il est le seul à présenter des spores de forme ovoïde dans la section où il est classé.

Biblio : DM 1986, n°63-64 : 81-82

Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET