



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius aleuriosmus Maire

Nom français : Cortinaire à odeur de farine

Description : Chapeau charnu de 5 à 10 (15) cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe-à marge enroulée ; cuticule visqueuse puis sèche parfois givrée d'un glacis blanc sur les jeunes exemplaires ; couleur gris ou crème blanchâtre parfois teintée de rosâtre pâle puis ocracée par plages, sans réaction à la potasse ; stipe peu élancé, blanc et orné de fibrilles concolores, à bulbe blanc plus ou moins marginé et roussissant à la base ; lames assez serrées, argilacé grisâtre enfin rouillées ; chair blanchâtre à crème blanchâtre, à forte odeur et saveur de farine ; réaction nulle à la potasse ; spores 10-13 x 6-7 μm .

Récoltes : en 2009 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à Soulignonnes (17).

Remarques : ce cortinaire est caractérisé par son aspect trapu, sa couleur blanchâtre et une forte odeur de farine ; à l'instar de *C. aleuriosmus*, deux autres cortinaires présentent une odeur farineuse plus ou moins fugace : *C. flavovirens* de couleur jaune-vert et *C. dionysae* de couleur brun olivâtre à lames bleutées.

Biblio : 1910 ; Bull.Soc.Myc.France 26 : 180

Fiche réalisée en avril 2012 par Patrick BOISSELET