



Photographies Michel Hairaud



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita virosa var. levipes Neville et Poumarat

Espèce rare poussant sous feuillus (chênes et châtaigniers) sur sol acide.

Cette variété diffère du type par sa taille plus importante du chapeau 6 -15 cm, à mamelon non excentré, s'étalant complètement à maturité et surtout son stipe (jusqu'à 20 cm de longueur) non pelucheux squameux mais lisse à sublisse, faiblement fibrilleux, avec un large bulbe basal. Anneau ample, fragile, floconneux. Volve épaisse, membraneuse, dont la partie supérieure est souvent apprimée sur le stipe.

Cette espèce, identifiée, par Michel Hairaud, figure dans l'inventaire de la sortie SMMA du 10.10.2004. Des poussées regroupant de nombreux spécimens (une centaine) ont également été observées en juin, septembre et octobre 2008 et juillet 2009 dans une zone bien délimitée, en forêt de l'Hermitain, près de la Mothe St Héray (79).

Réaction KOH, jaune sur la surface du chapeau et du stipe.

Biblio : Fungi Europaei, Amanitae (P. Neville & S. Poumarat) ; Bulletin SBCO année 2003 p. 425-426

Fiche réalisée en janvier 2011 par Annie GAILLARD